

# ialuset® PLUS



Crème et Compresse imprégnée stérile

## FORMES ET PRÉSENTATIONS

Crème et compresse stérile imprégnée d'acide hyaluronique et de sulfadiazine argentique.

**Crème** : Tube de 100 g ou de 25 g.

**Compresse imprégnée stérile** : Boîte de 10 ou de 3 (10 cm x 10 cm).

## COMPOSITION

**ialuset® PLUS Crème** : Acide hyaluronique (sel sodique) (0,2%), sulfadiazine argentique (1%), autres composants : decylester d'acide oléique, alcool cétéarylique et sodiumlauryl sulfate et sodium cétéaryl sulfate, macrogol, sorbitol liquide, glycérol, eau.

**ialuset® PLUS Compresse imprégnée stérile** : Compresse stérile imprégnée de crème d'acide hyaluronique (sel sodique) 0,05%, de sulfadiazine argentique (1%), autres composants : macrogol, glycérol, eau.

## PROPRIÉTÉS

L'acide hyaluronique est le composant principal de la substance fondamentale du derme. Il agit à toutes les phases du processus de cicatrisation. Il accélère la cicatrisation et la réépithélialisation des lésions cutanées.

Son pouvoir hygroscopique maintient un environnement humide favorable au processus de régénération tissulaire.

L'acide hyaluronique utilisé est obtenu par biofermentation.

La sulfadiazine argentique est un composé qui possède une activité antibactérienne marquée, essentiellement sur les bactéries Gram(-).

## INDICATIONS

ialuset® PLUS est un cicatrisant des plaies infectées et des brûlures, des affections dermatologiques primitivement bactériennes ou susceptibles de se surinfecter.

## MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

**Crème** : Après avoir effectué les soins de nettoyage habituels, appliquer la crème directement sur la plaie préalablement nettoyée et désinfectée en couche de 2 à 3 mm d'épaisseur environ ou bien déposer la crème sur une gaze stérile que l'on applique ensuite sur la plaie. La crème est recouverte d'une gaze stérile et l'ensemble peut être maintenu à l'aide d'un bandage approprié.

Avant de renouveler les applications, il est recommandé de nettoyer la plaie au sérum physiologique.

La fréquence de renouvellement est de 1 application par jour de la phase de bourgeonnement jusqu'à complète cicatrisation.

La crème peut être éliminée par simple lavage.

L'évolution de la cicatrisation de votre plaie ou brûlure reste à l'entière appréciation de votre médecin.

La durée du traitement est limitée à un mois.

**Compresse imprégnée stérile** : Après avoir retiré les 2 films protecteurs, la compresse est appliquée sur la plaie préalablement nettoyée et désinfectée. La compresse est ensuite recouverte d'une gaze stérile puis d'une ouate. L'ensemble du pansement est maintenu à l'aide d'un bandage approprié.

Avant de renouveler les applications, il est recommandé de nettoyer la plaie au sérum physiologique.

La fréquence de renouvellement est de 1 application par jour de la phase de bourgeonnement jusqu'à complète cicatrisation. L'évolution de la cicatrisation de votre plaie ou brûlure reste à l'entière appréciation de votre médecin.

La durée du traitement est limitée à un mois.

## EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS

Dans de très rares cas, des réactions locales d'hypersensibilité de type eczéma ont été observées. Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devra faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM).

## CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser ialuset® PLUS en cas d'hypersensibilité connue aux sulfamides – générale ou locale (eczéma de contact) - à l'acide hyaluronique ou à l'un des composants de ialuset® PLUS crème et compresse.

En raison de données limitées chez l'Homme, l'emploi de ialuset® PLUS n'est pas conseillé chez l'enfant de moins de 2 ans.

**NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET À SIGNALER À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.**



## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Respecter les méthodes de nettoyage et de désinfection des brûlures et des plaies, ainsi que de leurs pourtours. L'association de ialuset® PLUS à une déterision enzymatique n'a pas été étudiée.
- Éviter d'exposer les parties du corps traitées par ialuset® PLUS à une lumière vive (risque de photosensibilisation). Une coloration transitoire du lit de la plaie peut apparaître, qui peut être éliminée par simple lavage.
- Chez les sujets souffrant d'une insuffisance rénale ou hépatique, éviter l'application de la crème sur les plaies ouvertes.
- Enfant : ialuset® PLUS doit être utilisé avec prudence chez l'enfant de plus de 2 ans, la durée du traitement ne doit pas dépasser 15 jours sans avis médical.
- **Crème** : Bien refermer le tube après chaque utilisation. Ne pas appliquer l'embout du tube directement sur la plaie.
- **Compresse imprégnée stérile à usage unique** (Stérilisée aux rayons Beta) : ne pas réutiliser pour éviter tout risque de contamination.
- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.
- Tenir hors de la portée des enfants.
- Ne pas avaler.
- Rappelez les produits périmés ou non utilisés à votre pharmacien qui se chargera de leur élimination.
- Grossesse et allaitement : ialuset® PLUS doit être utilisé chez la femme enceinte et allaitante uniquement lorsque cela est nécessaire.

**EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**


## CONSERVATION

**NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR.**

Ce dispositif médical doit être conservé à une température inférieure à 30°C et à l'abri de la lumière. À utiliser dans les 6 mois après ouverture (tube).

**Année d'apposition du Marquage CE** : 2000.

**Date de révision de la notice** : Décembre 2021

 IBSA Pharma SAS  
Parc de Sophia-Antipolis  
Les 3 Moulins - 280, rue de Goa  
06600 ANTIBES - France

**CE**  
**0344**



Attention - Consulter les précautions d'emploi



Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé et consulter les instructions d'utilisation



À usage unique - Ne pas réutiliser  
Seules les compresses imprégnées stériles sont à usage unique



Dispositif médical



Système de barrière stérile unique avec emballage de protection extérieur  
Stérilisation par irradiation  
Seules les compresses imprégnées sont stériles



Consulter les instructions d'utilisation



Limite supérieure de température



Contient une substance médicamenteuse (sulfadiazine argentine)



Numéro de lot



Date limite d'utilisation



Fabricant



**LE TRI**  
**+ FACILE**

ÉLÉMENTS  
D'EMBALLAGE  
+ NOTICE

BAC  
DE TRI

Séparez les éléments avant de trier